

**Tabela 26a - Coeficientes de variação das estimativas de mulheres de 25 anos ou mais de idade, por situação de de exame preventivo para câncer de colo de útero e a época do último exame preventivo para câncer de colo de útero realizado, segundo as Unidades da Federação - Brasil - 2003**

Unidades da Federação	Coeficientes de variação das estimativas de mulheres de 25 anos ou mais de idade (%)					
	Total	Situação de realização de exame preventivo para câncer de colo de útero				
		Nunca fez	Já realizou			
			Total	Época do último exame realizado		
	Há menos de 3 anos	De 3 a 5 anos		Há 6 anos ou mais		
<b>Brasil (1)</b>	<b>0,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>
Rondônia (2)	1,8	8,7	3,9	4,8	13,8	19,5
Acre (2)	3,4	9,1	5,1	5,6	21,5	27,0
Amazonas (2)	1,8	7,8	4,2	4,4	11,0	23,2
Roraima (2)	3,7	17,1	4,0	5,0	22,4	30,6
Pará (2)	1,4	6,2	2,5	2,6	6,8	8,1
Amapá (2)	5,0	10,3	5,4	8,1	19,0	23,0
Tocantins	1,4	5,8	2,5	2,8	10,9	12,7
Maranhão	3,0	5,5	7,0	8,0	11,3	19,5
Piauí	3,4	8,0	5,5	5,5	15,6	13,1
Ceará	1,0	4,2	2,3	2,2	7,7	8,4
Rio Grande do Norte	2,3	6,9	2,3	2,6	9,4	16,4
Paraíba	2,1	5,4	5,0	6,0	11,2	9,9
Pernambuco	1,3	3,0	1,5	1,7	5,2	7,4
Alagoas	2,0	4,9	5,6	6,0	12,2	37,0
Sergipe	2,7	9,9	5,3	4,8	12,4	16,0
Bahia	1,1	3,4	2,1	2,3	4,7	8,4
Minas Gerais	0,8	2,9	1,2	1,4	4,8	5,2
Espírito Santo	1,7	5,7	2,2	2,8	11,0	12,4
Rio de Janeiro	0,8	4,0	1,1	1,4	4,6	4,9
São Paulo	0,7	3,4	0,9	1,0	3,9	4,7
Paraná	0,9	3,2	1,4	1,5	5,3	7,3
Santa Catarina	1,7	6,7	2,2	2,2	8,9	12,1
Rio Grande do Sul	0,8	4,4	1,5	1,6	4,2	6,2
Mato Grosso do Sul	2,0	8,6	2,4	2,7	12,0	16,0
Mato Grosso	1,6	8,6	3,5	4,4	7,9	14,8
Goiás	1,0	3,9	1,4	1,3	9,0	11,1
Distrito Federal	1,6	6,5	2,3	2,6	8,6	12,2

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003.

(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. (2) Exclusive a população da área rural.