

Tabela 27a - Coeficientes de variação das estimativas de mulheres de 25 anos ou mais de idade que já realizaram alguma vez exame preventivo para câncer de colo de útero, por anos de estudo, segundo as Unidades da Federação - Brasil - 2003

Unidades da Federação	Coeficientes de variação das estimativas mulheres de 25 anos ou mais de idade que já realizaram alguma vez exame de preventivo para câncer de colo do útero (%)						
	Total	Anos de estudo					
		Sem instrução e menos de 1 ano	1 a 3 anos	4 a 7 anos	8 a 10 anos	11 a 14 anos	15 anos ou mais
Brasil (1)	0,4	1,4	1,2	0,8	1,1	1,1	2,3
Rondônia (2)	3,9	9,7	6,0	5,5	10,0	9,7	18,7
Acre (2)	5,1	7,1	16,1	10,0	13,7	10,2	25,6
Amazonas (2)	4,2	10,4	16,5	6,3	8,4	6,7	19,8
Roraima (2)	4,0	14,3	15,3	10,0	11,8	12,0	30,5
Pará (2)	2,5	6,5	4,7	3,8	5,7	5,3	10,4
Amapá (2)	5,4	12,7	20,8	17,6	13,3	11,3	25
Tocantins	2,5	9,8	7,6	4,5	9,1	7,6	19,9
Maranhão	7,0	13,3	9,0	12,6	12,3	15,5	30,4
Piauí	5,5	6,2	7,7	8,1	12,6	17,2	32,5
Ceará	2,3	5,7	7,4	3,3	5,1	5,1	8,9
Rio Grande do Norte	2,3	7,3	8,3	4,6	11,4	6,8	17,8
Paraíba	5,0	12,5	9,0	8,4	8,8	10,9	22,4
Pernambuco	1,5	3,8	3,8	2,9	4,1	4,5	9,1
Alagoas	5,6	13,2	7,3	9,0	10,3	12,2	22,2
Sergipe	5,3	10,2	10,9	6,9	9,2	9,0	18,7
Bahia	2,1	3,7	3,2	3,7	4,9	4,7	9,7
Minas Gerais	1,2	4,1	3,4	2,0	3,7	3,4	6,4
Espírito Santo	2,2	7,7	6,7	3,6	7,1	8,9	16,8
Rio de Janeiro	1,1	5,5	3,8	2,4	3,2	2,9	5,9
São Paulo	0,9	3,7	2,9	1,7	2,4	2,4	4,9
Paraná	1,4	5,4	3,7	2,5	4,3	3,6	8,3
Santa Catarina	2,2	16,8	7,7	4,2	6,7	9,1	13,9
Rio Grande do Sul	1,5	6,7	5,3	2,3	4,5	3,9	5,7
Mato Grosso do Sul	2,4	8,8	6,5	4,8	7,7	7,6	14,9
Mato Grosso	3,5	7,8	6,1	4,7	8,3	9,1	15,6
Goiás	1,4	6,1	5,3	3,1	4,1	4,5	11,8
Distrito Federal	2,3	9,4	9,7	5,2	5,8	4,8	10,6

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003.

(1) Exclui a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. (2) Exclui a população da área rural.